

Impfung gegen COVID-19

Vaccinate WA 

[CovidVaccineWA.org](https://www.CovidVaccineWA.org)

Der Kampf gegen die Pandemie ist hart, aber jetzt haben wir Impfstoffe, die uns vor COVID-19 schützen.



Der Impfstoff wird Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Kosten für Ihre Impfung werden von der Landesregierung übernommen. Möglicherweise erheben die Anbieter eine Gebühr für die Verabreichung des Impfstoffs, aber diese wird höchstwahrscheinlich von der Krankenversicherung übernommen. Die Anbieter verzichten auf die Gebühr, wenn Sie sich diese nicht leisten können.



Fragen Sie, wie viele Dosen Sie benötigen.

Sie erhalten bei einigen Impfungen zwei Impfdosen, die drei bis vier Wochen auseinanderliegen. Bei anderen bekommen Sie nur eine Dosis. Eventuell müssen Sie sich nach zwei bis sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung geben lassen.



Die Impfstoffe sind sicher und wirksam.

Alle Impfstoffe sind von der U.S. Food and Drug Administration (FDA, US-amerikanische Arzneimittelbehörde) entweder vollständig zugelassen oder für den Notfall zugelassen, was bedeutet, dass die FDA keine ernsthaften Sicherheitsbedenken festgestellt hat.

5+

Jeder, der mindestens 5 Jahre alt ist, kann den Impfstoff erhalten.

Der COVID-19-Impfstoff steht allen Personen ab 5 Jahren zur Verfügung. Personen im Alter von 5 bis 17 Jahren können nur den Pfizer-BioNTech-Impfstoff erhalten. Besuchen Sie [VaccineLocator.doh.wa.gov](https://www.VaccineLocator.doh.wa.gov), um einen Termin zu finden und zu vereinbaren. Sie können auch 1-800-525-0127 anrufen und dann # drücken. Geben Sie für Dolmetscherdienste Ihre Sprache an, wenn den Sie den Anruf entgegennehmen.



Bei Ihnen können Nebenwirkungen auftreten.

Wie auch bei anderen Routine-Impfungen kann es nach Verabreichung des Impfstoffs zu Schmerzen im Arm, Fieber, Kopfschmerzen oder Müdigkeit kommen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Impfstoff wirkt.



Erhalten Sie Ihre Sicherheit aufrecht.

Tragen Sie nach Erhalt des Impfstoffs Ihre Maske, halten Sie einen Abstand von zwei Metern voneinander und halten Sie Versammlungen im kleinen Rahmen.

Fragen? Besuchen Sie: www.CovidVaccineWA.org

Impfung gegen COVID-19

Welche Impfstoffe stehen zur Verfügung?

Es stehen mehrere Impfstoffe zur Verfügung.

Alle haben von der FDA eine Notfallzulassung erhalten. Medizinische Experten des Advisory Committee for Immunization Practices (Beratender Ausschuss für Immunisierungspraktiken) und der Western States Scientific Safety Review Workgroup (Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für Sicherheitsüberprüfungen der Weststaaten) haben bestätigt, dass die Impfstoffe unseren Sicherheitsstandards entsprechen.

Wer sollte eine COVID-19-Impfung erhalten?

Es ist Ihnen überlassen, ob Sie sich impfen lassen. Wenn Sie sich für die Impfung entscheiden, informieren Sie Ihr Impfteam bitte, wenn Sie:

- in der Vergangenheit schwere allergische Reaktionen hatten
- Fieber haben
- eine Blutungsstörung haben oder Blutverdünner nehmen
- immungeschwächt sind oder ein Arzneimittel einnehmen, das Ihr Immunsystem beeinträchtigt
- schwanger sind, planen, schwanger zu werden oder gerade stillen
- einen anderen COVID-19-Impfstoff erhalten haben

Sie sollten den Impfstoff nicht erhalten, wenn Sie eine schwerwiegende allergische Reaktion auf eine frühere Dosis des COVID-19-Impfstoffs oder auf einen Bestandteil des Impfstoffs hatten.

Die Impfstoffe enthalten den Wirkstoff Messenger-RNA (mRNA) oder Adenovirus sowie Fett, Salze und Zucker, um den Wirkstoff zu schützen und sein Wirken im Körper zu verbessern.

Sie müssen mindestens 5 Jahre alt sein, um den Pfizer-BioNTech-Impfstoff zu erhalten, und 18 Jahre alt, um den Moderna- oder den Johnson & Johnson-Impfstoff zu erhalten.

Was sind die Nebenwirkungen?

Es kommt häufig vor, dass ein bis drei Tage nach Erhalt des Impfstoffs Nebenwirkungen auftreten. Häufige Nebenwirkungen sind Müdigkeit, Muskelschmerzen, Schmerzen in Ihrem Arm, wo Sie Ihre Spritze bekommen haben, Fieber, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Schüttelfrost, Übelkeit oder Erbrechen. Wenn Ihre Symptome nicht vorübergehen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Klinik.

Sie sollten 15 bis 30 Minuten warten, bevor Sie das Impfzentrum verlassen, damit Ihr Impfteam Ihnen helfen kann, wenn Sie eine allergische Reaktion oder andere Nebenwirkungen haben. Während Sie warten, können Sie sich bei v-safe anmelden, um Nebenwirkungen zu melden: vsafe.cdc.gov (nur auf Englisch verfügbar).

Sie oder Ihr Impfstoffanbieter können Nebenwirkungen auch an das Berichtssystem für Impfnebenwirkungen (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) melden: vaers.hhs.gov/reportevent.html (nur auf Englisch verfügbar).

Rufen Sie 911 an, wenn Sie nach Verlassen der Klinik eine allergische Reaktion haben.

Anzeichen einer allergischen Reaktion sind: Atembeschwerden, Schwellung von Gesicht und Hals, schneller Herzschlag, ein starker Ausschlag am ganzen Körper, Schwindel und Schwäche.

Was passiert, nachdem ich geimpft wurde?

Wenn Sie einen Impfstoff erhalten, der in zwei Dosen verabreicht wird, lassen Sie sich einen Termin für Ihre zweite Dosis geben.

Sie müssen nach drei bis vier Wochen noch einmal erscheinen, um Ihre zweite Dosis zu bekommen.

Es dauert bis zu zwei Wochen, nachdem die Impfung abgeschlossen ist, bis Sie einen maximalen Schutz genießen. Es wird außerdem empfohlen, sich nach zwei bis sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung geben zu lassen, um Ihren Schutz aufrechtzuerhalten.



DOH 348-782 December 2021 - German

Um dieses Dokument in einem anderen Format zu erhalten, rufen Sie bitte 1-800-525-0127 an. Gehörlose oder schwerhörige Kunden rufen bitte 711 (Washington Relay) an oder senden eine E-Mail an civil.rights@doh.wa.gov.