

افت واکسین در برابر کووید 19



مبارزه با مشکلاتی که شده، مگر حال لواکنی داریم که خود را در برابر کووید 19 محافظت کنیم.



واکسین برتری ما بطور رایگان تهی همیشه بود.

زهین واکسین شما را دولت تفدرال پرداخت خواهد کرد. ل شرنه پای پول گفوت مشود و نه همباری تان بل داده شود بی هکین دفعش مایز از شما نبلدص فاب طن لیل پول بگی رنگ مش مبرای در عفولکسین بیفتتر او مراجع کرده ای.



بپرسید که به چند دوز واکسین ضرورت دارد.

شما به دو دوز عضو واکسین ها ضرورت خواهد داشت که دوز دوم آن سه ماهی چه اوفت بعد از دوز اولت طبیقی می شود و دومی گوارکسین با فقط یک دوزی میباشد. ممکن است دوتاش شوفت بعد از به ی کوو تقویت باشد.



واکسین امدی و مؤثرتند.

واکسین ها در اجل و گوری از نیش ار کووید 19 می مؤثرتند. همه واکسین های کاملتتی دشدها مجاز به استفاده طراری توسط U.S. Food and Drug Administration (FDA) سازمان غذا و داروی آمریکا هستند. به این معنی که FDA گران جدی در مورد ایضی بدل کرده است.



تلمی افرادی که سن شان 5 سال و بیشتر از آن باشد میوان واکسین زنند.

واکسین کووید 19 برای تمام افرادی که سن شان 5 سال و بیشتر از آن باشد دس ترس اس بلش خاص یک سن شان از 5 الی 17 سالهاش فقط می توان واکسین Pfizer-BioNTech را در عفلت برای در عفلت تقیم اوقات و عینی قرار مالتق به [VaccineLocator.doh.wa.gov](https://vaccineLocator.doh.wa.gov) مراجع می ای. هم چنان شما میوان بی باش ماره 1-800-525-0127 به تماسش دکولید # رفلساردهی برای خدمات ترجمانی هن گلهاس خب تماس زبان خود ریلگهید.



شاید عوارض چلبی را حکنید.

همان شوا واکسین ها در ناحی فبازوی تان احساس درد خواهد کرد، تب، سردی و احساس خستگینی خواهد داشت بلکن نشانها هوستن دکواکسین کامی کند.



مصی وینمانید.

زنجی واکسین در عفلت کردید، ماسک پوشید، اذی گران ش شفوت بو متر فطراش ته باشد و از اجتماعات دوری زید.

رواوتکسین دیرابکویو د 19

عوارض جانبی آن چیست؟

هوسه رزوبعد از دریافت واکسین ناشستن عوارض جانبی معمول است. عوارض جانبی عام عبارتند از درد عضلات، احساس درد در ناحیه بازو و جلی واکسین تزریقی مودهی، تب، سر درد، درد وجود، لرزه بلدی اسبقراق اگر عالهی شمل بر طرف نشدن بولکی تکلینی کخوی ش رنگ بویو.

شمل بعد از دریافت واکسین ری بی ای د 15 الی 30 قوق مدر سرایت واکسین بمانی بویو اگر در قبال واکسین حسی تی ش ان هادی در آن صورتتدهیکمن زودا کسین شملی بولکی با شمل کم ککن د. هنگالیت ظاور س ای ت، شملی بولکی در safe بثبت نکمن یهت اراج بمره گونه عوارض جانبی گزارش دهی:

[vsafe.cdc.gov](https://www.cdc.gov/vsafe)

شما ویکمن زودا کسین شمل ما چمن افزیتولند در مورد ه گونه عوارض جانبی به Vaccine Adverse Event Reporting (VAERS) System سیستم گزارش دهی حادثه واکسین گزارش دهد: vaers.hhs.gov/reportevent.html

اگر در صورت ترک کردن واکسین حسی تی ش ان بطرد با شماره 911 به تماسش وی بنشان ه ای حلیس تی عبارتاند از مشکلات نفسی، دوپن دهنگی روی و گلیوش ماتشینی شن ضرباقل ب، نا آرم و چ، سرچرخو ض عف.

بعد از دریافت واکسین برای چه اتفاقی می افتد؟

اگر شما واکسین دو دوزه گیرفت های دیر اری ایافت دوز دوم قرارم الق انتتوی کین دیر ای ورافت دوز دوم شلهای سه الی چه اوفت بعد مراجع نم ایی د.

بعد از ورافت واکسین دوفت هر رلبدر میگی رکه شمل بعضورتکامل ح فبط شوی ده مچن زبر ای ادم ح فظک تان بویسه می شود و تاش شففت ببع ی ک دوتق بوی در طفت کندی.

کدام اکسین قابل ترس است؟

چراکسین قابل اس ترس است.

همه واکسین های کامالتی شدهی مجاز به بلقباده اض طراری توسط U.S. Food and Drug Administration

(FDA) Administration، سازمان غذا و داروی رایجی (استند ب هین مبعی که FDA گران ی جدی و مورد ای بی پی دن کرده است.

چه کسین ای واکسین کویو د 19 را دریافت کنند؟

شیرمات طب و واکسین تلخی ارداری اگتوص می مگوتی نکه واکسین می زنی د، شلهای ته ویکمن زودا کسین خوی ش را در جری ان قرار دهی د، اگر:

- تاریخ چخس اسیت های شنی داری د
 - تب داری
 - بین نظم بونری زی داری و یا داروی غلی کلن نده خون را مصرفی کنی د
 - داروی رام رقی کنی د که سیستم ای بی شمل رلمبشر می سازد
 - حامله سی تی بتصر می دارد حامله شوی و بیهه طفلی تان ش می دهی د
- واکسین دی گر کویو د 19 را در قفلت کرده ی د

اگر در قبال بوزدق بل واکسین کویو د 19 س ای ر عناصر واکسین حلیس تی شنی د رنشان داده ی ه در آن صورت بقی د واکسین بوزنی د.

واکسین داری اجزای عالهی ام رسان (mRNA) RNA و ویروس ها، مچن ان بوی، نمک وه اش کریات مباحث تا از واکسین ح فظت کنن ودر بینه گونیه متفع الهی کنی د.

شمل برای دریافت واکسین Pfizer-BioNTech حداقل 5 سال س داش بباش یهد برای دریافت واکسین Moderna و Johnson & Johnson لکم از کم 18 سال.



DOH 348-782 November 2021 Dari

برای درخواست های بیشتر بشکل دیگر بولم بر 1-800-525-0127 تماس گیری د. بیشتر یان نترن وی واکسین کسین ب س بوی بوشن بول طلب مشماره 711 (Washington Relay) (بتم اسشون د) یا به آدرس civil.rights@doh.wa.gov ایمیل نم ایی د.